

Prevalencia de xerostomía e hiposalivación en población femenina en etapa de postmenopausia

Ernesto Javier Andrade¹,  0000-0002-9511-3678

Miguel Germán Arocena Sutz¹,  0000-0002-7682-4028

Rosana Elena Amaral Schiaffino¹,  0000-0001-6052-3514

Marcelo Rudy Kreiner Feder¹,  0000-0001-6463-1280

Enrique Bernardo Rotemberg Wilf¹,  0000-0002-0686-8607

Martín Puch Damiano¹,  0000-0001-9578-9363

Claudia Delia Capó García¹,  0000-0001-9888-506X

Lucía Fernanda Minini Rivas¹,  0000-0001-8604-3041

Andrea Rodríguez-Pereira¹,  0000-0002-3887-5836



DOI: 10.22592/ode2022nesp2e542

Resumen

Objetivos: Evaluar el flujo salival en reposo y estimulado y la prevalencia de xerostomía y/ o hiposialia en mujeres posmenopáusicas, considerando la condición sistémica de cada participante.

Objetivos específicos: a) estimar la correspondencia entre el relato de xerostomía y la condición de hiposialia; b) analizar la probable asociación entre xerostomía e hiposalivación con signos y/o síntomas de periodontitis.

Métodos: Es un estudio descriptivo y transversal realizado en la Clínica Integrada de la Facultad de Odontología de la Udelar. La muestra estará compuesta por 25 participantes en etapa postmenopáusica y similar tamaño en período fértil. La metodología consiste en anamnesis y sialometría de reposo y estimulada. Criterios de inclusión: sexo femenino, rango etario 45-55 años, en etapa posmenopáusica. Como grupo control se relevará población de sexo femenino en etapa fértil y rango etario 35 a 44 años. Criterios de exclusión: haber recibido profilaxis bucal profesional y/o tratamiento periodontal los últimos 6 meses. Se realiza anamnesis sobre xerostomía y de la historia clínica se obtienen los índices periodontales registrados antes del tratamiento. La obtención de saliva de reposo y estimulada sigue un protocolo.

Resultados esperados: La sequedad bucal persistente es un importante problema de salud que ocasiona alteraciones funcionales y lesiones orales. Se espera que el grupo objeto de estudio presente mayor prevalencia de sequedad bucal y/o de enfermedad periodontal.

Palabras clave: xerostomía, hiposalivación, menopausia, salud oral, periodontitis.

¹Cátedra de Fisiología General y Bucodental, Facultad de Odontología, Universidad de la República.